



## Nai Bai Cai

(*Brassica rapa* (Pak Choi Group))  
[nai bai cai])

## Kubis Susu



Scan this for more  
gardening resources



**Seed Storage:** Store seeds in a sealed plastic bag at 4°C.

**Penyimpanan Benih:** Simpan biji-biji benih di dalam beg plastik yang ditutup pada suhu 4°C.

### Step 1 / Langkah 1

- Fill an egg tray with fresh seed raising mix. Holes should be made at the base of each cell for drainage.
- Isikan dulang telur dengan campuran tanah untuk benih yang baru. Lubang harus dibuat di dasar setiap sel untuk pengaliran air.

### Step 2 / Langkah 2

- Make a hole (about 1 cm deep) in the soil inside each cell and place 1 to 2 seeds into it. Close it by lightly patting soil over it. Water the mix until it is moist.
- Buat satu lubang (lebih kurang 1 cm) dalam tanah di dalam setiap sel dan masukkan 1 atau 2 biji benih ke dalamnya. Tutupkan benih tersebut dengan menepuk tanah di atasnya secara perlahan-lahan. Siram air pada campuran tanah sehingga lembap.

### Step 3 / Langkah 3

- Expose the tray to at least 4 hrs of direct sunlight daily and protect it from rain. Do keep the growing mix moist at all times. Germination takes 3 to 5 days.
- Dedahkan dulang kepada sinaran cahaya matahari sekurang-kurangnya 4 jam sehari dan melindunginya daripada hujan. Pastikan campuran tanah entiasa lembap. Percambahan mengambil masa 3 hingga 5 hari.

### Step 4 / Langkah 4

- After the seedlings have produced 2 to 3 pairs of leaves, they can be transplanted to their final growing, sunny location.
- Setelah anak benih menghasilkan 2 hingga 3 pasang daun, pindahkan ke lokasi akhir yang cerah.

### Step 5 / Langkah 5

- Apply a small amount of organic fertiliser every 1 to 2 weeks.
- Plants should be kept moist at all times.
- Cover with a clear netting to minimise pest damage.
- Bubuh sedikit baja organik setiap 1 atau 2 minggu.
- Pastikan tanaman sentiasa lembap.
- Tutup dengan jaring putih untuk mengurangkan ancaman serangga perosak.

### Harvesting / Tualan

- Once the plants reach 10 cm tall or the desired size, harvest by uprooting them.
- Tender shoots and leaves can also be picked for continual harvesting.
- Setelah tanaman mencapai 10 cm atau ketinggian yang diingini, menuai seluruh tanaman tersebut bersama dengan akar.
- Untuk penuianan berterusan, pucuk dan daun yang lembut juga boleh dipetik.



# 奶白菜

(*Brassica rapa* (Pak Choi Group)  
[nai bai cai])

நய் பாய் சாய்

## 步骤 1 / படிநிலை 1

- 在鸡蛋托盘里装入新鲜的育苗混合土，然后在每一格的底部开小孔，用来排水。
- 确保每块育苗板上都有足够的土壤，以便于播种。将种子撒在土壤表面，轻轻盖上一层薄土。
- 将托盘放入阴凉处，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。

## 步骤 2 / படிநிலை 2

- 在每一格内的土壤中挖一个小洞（约1厘米深），放入1至2粒种子。轻轻拍打土壤，将种子埋进土壤中，再洒水，使土壤保持湿润。
- 将托盘放入阴凉处，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。

## 步骤 3 / படிநிலை 3

- 保证托盘每天有至少4小时的阳光照射，且勿放置在可遭到雨淋的位置。育苗混合土应该时刻保持湿润状态，发芽时间介于3~5天。
- 当幼苗长出2至3片真叶后，将其移植到更大的容器中，如花盆或花园地，以获得更好的生长空间。

## 如何储存种子：

把种子放入密封塑料袋，储存在4 °C干燥的环境中。

## விதையைப் பத்திரப்படுத்தும் முறை :

விதைகளைக் காற்றுப்புகாத பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு, 4°C குளிரில் வைத்திருக்கவும்.

## 步骤 4 / படிநிலை 4

- 当幼苗长出2至3片真叶后，将其移植到阳光充足的地方。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。

## 步骤 5 / படிநிலை 5

- 每1~2周施少量的有机肥料。
- 植株应时刻保持土壤湿润。
- 可以使用遮阳网覆盖植物防止害虫侵蚀。
- 1 帽子 2 叶子 3 茎 4 根 5 花 6 果实
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。

## 收成 / அறுவடை

- 蔬菜生长到10厘米高或所需高度时，将蔬菜连根拔起。
- 若养护得当，嫩枝与嫩叶可以长期采摘。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。
- 将托盘移至阳光充足的地方，保持温度在15°C左右，直到幼苗长出2至3片真叶。