



Lady's Finger (*Abelmoschus esculentus*) (LF) Bendi



Scan this for more
gardening resources



Seed Storage: Store seeds in a sealed plastic bag at 4°C.

Penyimpanan Benih: Simpan biji-biji benih di dalam beg plastik yang ditutup pada suhu 4°C.

Step 1 / Langkah 1

- Fill an egg tray with fresh seed raising mix. Holes should be made at the base of each cell for drainage.
- Isi biji benih yang segar dan telah digaulkan ke dalam dulang telur. Tebuk lubang di setiap cetak telur sebagai saluran air.

Step 2 / Langkah 2

- Make a hole (about 1 cm deep) in the soil inside each cell and place 1 to 2 seeds into it. Close it by lightly patting soil over it. Water the mix until it is moist.
- Buat lubang sedalam satu sentimeter di dalam cetak yang berisi tanah. Tutupkan dengan sedikit tanah. Tepuk tanah tersebut perlahan-lahan. Siram air sehingga lembap.

Step 3 / Langkah 3

- Expose the tray to at least 4 hrs of direct sunlight daily and protect it from rain. Do keep the growing mix moist at all times. Germination takes 3 to 5 days.
- Dedahkan bekas itu secara langsung di bawah cahaya matahari sekurang-kurangnya 4 jam setiap hari dan lindunginya dari hujan. Pastikan benih yang sedang tumbuh itu dalam keadaan lembap setiap masa. Germinasi mengambil masa 3 hingga 5 hari.

Step 4 / Langkah 4

- Remove the weaker seedlings. When the remaining seedlings produce 2 or 3 pairs of leaves, transplant each one into a 30 cm pot or an outdoor garden bed, spaced 30 to 45 cm apart.
- Grow it in a sunny location with a support, and keep it moist at all times. Apply a small amount of organic fertiliser on the soil fortnightly.
- Buang anak benih yang paling lemah. Apabila biji benih bercambah dan menghasilkan dua atau tiga pasang daun, tukarkan tempatnya ke dalam pasu yang berukuran 30 sentimeter atau di sebahagian taman sebagai batas biji benih. Tanam biji benih di antara 30 hingga 45 sentimeter.
- Tanamlah di kawasan yang bercahaya menggunakan sokongan dan pastikan tanaman sentiasa lembap. Letakkan sedikit baja organik di tanah sekali pada setiap 2 minggu.

Harvesting / Tuai

- Plants should flower 40 to 90 days after sowing and the fruit should form after pollination. Once it grows to the desired size, harvest the fruit by cutting its stalk.
- Pokok akan mula berbunga antara 40 hingga 90 hari selepas ditanam dan akan berbuah selepas proses pendebungaan. Setelah pokok bertumbuh kepada saiz yang diingini, tuai buah-buahan dengan memotong batang pokok.



羊角豆

(*Abelmoschus esculentus*) (LF)

വെൺടൈക്കായ്

步骤 1 / பாரிசை 1

- 在鸡蛋盒每个蛋壳位里装满新鲜的催芽混合土。在蛋壳位底部戳几个小孔以便排水。
 - ഒരു മുട്ടൈ ആട്ടക്കുത്തട്ടില് വിതൈ വാര്ക്കുമ് മണ്ണ കല്ലവയ്ക്ക് നിർപ്പാർക്കണം. വള്ളമാഞ്ഞത്തിന്റെ കാക്ക്, ഓവൽവോറു കുമ്പിയിൽ അടിച്ചിലുമ് ഓട്ടടക്കണ പ്രോട്ടോസൈറ്റുകൾ.

步骤 2 / படிநிலை 2

- 在土壤中央挖一个1公分深的小坑，然后放入1~2粒种子。用泥土覆盖再轻轻拍打。浇水让土壤湿润时请勿太用力或过量。
 - ஓவ்வொரு குழியிலும் உள்ள மண்ணில் (சுமார் 1 செண்டிமீட்டர் ஆழத்திற்கு) ஓட்டடைப்போடுங்கள். ஓவ்வொரு ஓட்டடையிலும் 1 முதல் 2 விதைகளை வைத்து, மண்ணால் விதைகளை லேசாக மூடுங்கள். மண்ணை கலவை ஈரமாகும்வரை தண்ணீர் ஊற்றாங்கள்.

步骤 3 / പട്ടിക്കുളമ് 3

- 将蛋盒放在有充足阳光直照至少4个小时的位置，且勿放置在可遭到雨淋的位置。确保催芽混合土时刻保持湿润。发芽时间介于3~5天。
 - இந்த அடுக்குத்தட்டைத் தினமும் குறைந்தது 4 மணிநேரம் நேரடியான சூரிய ஓளியில் காட்டுங்கள். மழை படாமல் பாதுகாக்கவும். மண் கலவையை எப்போதும் ரார்மாக வைத்திருங்கள். விடை முளைப்பதற்கு 3 முதல் 5 நாட்கள் எடுக்கும்.

如何储存种子：

把种子放入密封塑料袋，储存在4摄氏度干燥的环境中。

വിക്രയപ്പ് പട്ടിാമ്പുകേട്ടുമെന്നു :

விதைகளைக் காற்றுப்புகாது பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு, 4°C குளிரில் வைத்திருக்கவும்.

步骤 4 / പട്ടികയേണ്ടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

收成 / അന്വത്ത്

- 植株应该在播种后的40~90天开始开花，并在授粉后结果。一旦长到理想的大小，就可切割果梗收成。
 - செடிகளை விடைத்து 40 முதல் 90 நாட்களுக்குப் பிறகு பூக்கத் தொடங்கும். மகரநதச் சேர்க்கைக்குப் பிறகு பழம் காப்பக்கத் தொடங்கும். விரும்பும் அளவுக்குப் பழம் வளர்ந்தவுடன், பழத்தின் தண்டை வெட்டி அறுவடை செய்யப்படுகள்.